



ИНСТРУКЦИЯ

по применению Амита форте для лечения собак и кошек при акарозах

(Организация-разработчик: ООО «НВЦ Агроветзащита», Россия, 129329,
г. Москва, ул. Кольская, д. 1, стр. 1)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Амит форте (Amit forte).

Международные непатентованные наименования действующих веществ: фипронил, дифенгидрамин, дифлубензурон.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Амит форте в качестве действующих веществ в 1 мл содержит фипронил – 1,0 мг, димедрол – 5,0 мг и дифлубензурон – 0,5 мг, а в качестве вспомогательных веществ диметилсульфоксид и полиэтиленгликоль 200.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой бесцветную или желтого цвета жидкость.

Срок годности лекарственного препарата в закрытой упаковке производителя при соблюдении условий хранения - 2 года со дня производства, после первого вскрытия флакона – 28 суток. Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.

4. Выпускают Амит форте расфасованным по 1,0 и 1,4 мл в полимерные пипетки-капельницы разового применения; по 10 мл в стеклянные флаконы, укупоренные резиновыми пробками и обкатанные алюминиевыми колпачками; по 15, 20 и 30 мл в полимерные флаконы-капельницы, укупоренные полимерными крышками. Флаконы и флаконы-капельницы помещают индивидуально, пипетки-капельницы по 4 штуки в картонные пачки вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 0 °С до 25 °С.

6. Амит форте следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Амит форте относится к комбинированным акарицидным лекарственным препаратам с противозудным действием.

10. Фипронил, входящий в состав препарата, обладает выраженным контактным акарицидным действием в отношении личиночных и половозрелых фаз развития саркоптоидных (чесоточных) и демодекозных клещей, включая *Sarcoptes canis*, *Otodectes cynotis*, *Notoedres cati*, *Demodex canis*, паразитирующих на собаках и кошках.

Механизм действия фипронила заключается в блокировании ГАМК-зависимых рецепторов эктопаразитов, нарушении передачи нервных импульсов, что приводит к параличу и гибели клещей.

Дифлубензурон, ингибируя синтез хитина у членистоногих, нарушает процесс линьки, яйцекладки и выводимости личинок из яиц, что приводит к прекращению пополнения популяции.

Димедрол является блокатором H₁-гистаминных рецепторов, оказывает местное противовоспалительное и анестезирующее действие, снимает зуд.

После кожного нанесения лекарственного препарата входящие в его состав активные вещества, равномерно распределяются по поверхности тела, практически не всасываясь в системный кровоток, накапливаются в эпидермисе, волосяных луковицах и сальных железах тела животного и оказывают длительное акарицидное и местное противовоспалительное действие.

Амит форте по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывают резорбтивно-токсического, местно-раздражающего и sensibilizing действия; токсичен для пчел, а также рыб и других гидробионтов.

III. Порядок применения

11. Амит форте назначают собакам и кошкам с 8-недельного возраста с лечебной целью при саркоптозе, отодектозе, отодектозе, хейлетиеллезе и демодекозе.

12. Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам лекарственного препарата. Не подлежат обработке больные инфекционными болезнями, ослабленные и выздоравливающие животные. Не допускается аурикулярное применение препарата (при отодектозе) при прободении барабанной перепонки.

13. При поражении собак саркоптозом, хейлетиеллезом или демодекозом, кошек - отодектозом Амит форте наносят местно на предварительно очищенные от струпуев и корочек пораженные места, равномерно распределяя по пораженному участку с захватом до 1 см пограничной здоровой кожи от периферии к центру. Для предотвращения слизывания препарата животным надевают намордник, шейный воротник или смыкают челюсти петлей из тесьмы, которые снимают через 15 – 20 мин после нанесения препарата.

Обработку проводят 2-5 раз с интервалом в 5-7 дней до клинического выздоровления животного, которое подтверждают двумя отрицательными

результатами акарологических исследований.

Животных с обширными участками поражения кожи обрабатывают в два приема с интервалом один день, нанося препарат сначала на одну половину пораженной поверхности тела, а затем на другую.

При акарозах, осложненных бактериальной или грибковой инфекцией, рекомендуется комплексное лечение с применением иммуномодулирующих, антибактериальных и противогрибковых средств в соответствии с инструкциями по их применению.

При отодектозе (ушной чесотке) собак и кошек наружный слуховой проход очищают от струпуев и корок, затем закапывают в каждое ухо по 3-4 капли препарата (в зависимости от размера животного). С целью более полной обработки всей поверхности уха и слухового прохода ушную раковину складывают пополам и слегка массируют ее основание. Для предотвращения разбрызгивания препарата (если животное трясет головой), следует в течение нескольких минут фиксировать голову, а при попадании капель на шерсть ее следует тщательно протереть.

Обработку проводят двукратно с интервалом 7-10 дней. В запущенных случаях заболевания, осложненных отитами, назначают комплексное лечение с применением антибактериальных и противовоспалительных средства в соответствии с инструкциями по их применению. При необходимости курс лечения повторяют до клинического выздоровления животного, которое подтверждают двумя отрицательными результатами акарологических исследований.

Амит форте обязательно вводят в оба уха, даже в случаях поражения отодектозом только одного уха.

14. При передозировке или попадании препарата внутрь у животного может наблюдаться избыточное слюноотделение, мышечная дрожь, рвота. Специфические средства детоксикации отсутствуют, применяют общие меры, направленные на выведение лекарственного препарата из организма.

15. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

16. Запрещается применять лекарственный препарат беременным и лактирующим самкам, а также щенкам и котятм моложе 8-недельного возраста.

17. Следует избегать нарушений схемы применения лекарственного препарата, так как это может привести к снижению эффективности. В случае пропуска очередной обработки ее проводят в той же дозе по той же схеме.

18. Побочных явлений и осложнений при применении Амит форте в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и проявлении аллергических реакций, обработки прекращают, препарат смывают водой с моющим средством и проводят десенсибилизирующую терапию.

19. Амит форте не следует применять одновременно с другими акарицидными препаратами. Сведения о несовместимости лекарственного препарата с лекарственными средствами других фармакологических групп и

кормовыми добавками отсутствуют.

20. Лекарственный препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с лекарственным препаратом Амит форте следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

22. Людям с гиперчувствительностью к компонентам лекарственного препарата следует избегать прямого контакта с Амифом форте. Во время работы с препаратом не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Не следует гладить животное и допускать его к маленьким детям в течение 24 часов после обработки.

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей; она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

23. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения. ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1

Наименование, адрес организации, уполномоченной владельцем или держателем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя. ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1

С согласованием настоящей инструкции считать утратившей силу инструкцию по применению Амит форте для лечения собак и кошек при саркаптоидозах и демодекозе, утвержденную Россельхознадзором 13 декабря 2013 года.

Номер регистрационного удостоверения 77-3-28.13-1715-ПВР-3-5.8/02187