

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя
Россельхознадзора



Н.А.ВЛАСОВ

01.09.2017

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата ЭМИЦИДИН[®] 2,5% раствор для инъекций
для лечения собак и кошек при патологических состояниях, сопровождающихся
гипоксией

(Организация-разработчик: ООО «НВЦ Агроветзащита»,
Россия, 129329, г.Москва, Игарский проезд, д. 4)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: ЭМИЦИДИН[®] 2,5% раствор для инъекций (Solution EMICIDIN[®] 2,5% for injection).

Группировочное наименование: этилметилгидроксипиридина сукцинат.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

ЭМИЦИДИН[®] 2,5% раствор для инъекций в качестве действующего вещества содержит этилметилгидроксипиридина сукцинат – 25 мг/мл и в качестве вспомогательного вещества - воду для инъекций.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой бесцветную или светло-желтого цвета прозрачную жидкость.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения – 3 года со дня производства. ЭМИЦИДИН[®] 2,5% раствор для инъекций запрещается применять по истечении срока годности.

4. ЭМИЦИДИН[®] 2,5% раствор для инъекций выпускают расфасованным по 1, 2, 3 и 5 мл в стеклянные ампулы, упакованные по 5 или 10 штук в контурную ячейковую упаковку, которую помещают в пачку из картона; по 2, 5, 10, 50, 100 мл в стеклянные флаконы, упакованные поштучно или по 4, 5, 6, 8, 10 штук в картонную пачку. Допускается выпуск препарата расфасованным по 50, 100 мл в стеклянные флаконы без помещения в картонную пачку. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению препарата.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5 °С до 25 °С.

6. ЭМИЦИДИН[®] 2,5% раствор для инъекций следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Фармакологическая группа: антиоксиданты и антигипоксанты.

10. Входящий в состав препарата этилметилгидроксипиридина сукцинат является ингибитором свободно-радикальных процессов в организме, обладает выражен-

ными антиоксидантными, антигипоксическими и мембранопротекторными свойствами, оказывает лечебное и профилактическое действие при гипоксиях различной этиологии.

Механизм действия заключается в способности препарата уменьшать процессы перекисного окисления липидов в мембранах клеток, связывать свободные радикалы, влиять на энергетический обмен, увеличивая степень энергизации клеток, повышать устойчивость организма к кислородной недостаточности.

После парентерального применения препарат быстро распределяется в органах и тканях животного. Выводится из организма в основном с мочой в виде метаболитов и в незначительном количестве в неизменном виде.

ЭМИЦИДИН® 2,5% раствор для инъекций по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), не обладает местнораздражающими, кумулятивными, эмбриотоксическими и тератогенными свойствами.

III. Порядок применения

11. ЭМИЦИДИН® 2,5% раствор для инъекций назначают собакам и кошкам с лечебной и профилактической целью при острой, хронической сердечно-сосудистой и сердечно-легочной недостаточности, в восстановительный период после перенесенных заболеваний или хирургических операций, в ветеринарной гериатрии, при патологических состояниях, сопровождающихся гипоксией (кислородной недостаточностью) органов и тканей, при раневой патологии (раны, дерматиты, трофические язвы, ожоги, обморожения).

12. Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам лекарственного препарата.

13. ЭМИЦИДИН® 2,5% раствор для инъекций вводят подкожно, внутримышечно или внутривенно (капельно, со скоростью 60 капель в минуту) в дозе 1,0 - 4,0 мл препарата на 10 кг массы животного (2,5 – 10 мг/кг массы животного по действующему веществу) один или два раза в сутки в течение 5-15 дней.

В ветеринарной гериатрии ЭМИЦИДИН® 2,5% раствор для инъекций применяют собакам и кошкам старше 7 лет в весенний и осенний период один раз в сутки в течение 10-30 дней в дозе 1,0 мл на 10 кг массы животного (2,5 мг/кг массы животного по действующему веществу).

Дозу, продолжительность курса и кратность применения препарата назначает лечащий ветеринарный врач в зависимости от физиологического состояния животного и течения болезни.

14. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

15. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

16. Лекарственный препарат может назначаться беременным и лактирующим животным, щенкам и котят по «жизненным» показаниям и применяться под контролем ветеринарного врача.

17. Следует избегать нарушений рекомендуемой схемы применения лекарственного препарата во избежание снижения его эффективности. В случае пропуска введения одной или нескольких доз препарата курс применения необходимо возобновить как можно скорее в той же дозе по той же схеме.

18. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается.

19. Применение лекарственного препарата не исключает использование других средств патогенетической и симптоматической терапии.

20. Препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с препаратом ЭМИЦИДИН® 2,5% раствором для инъекций следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

22. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом ЭМИЦИДИН® 2,5% раствором для инъекций. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1.

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Эмицидин 2,5% раствора для инъекций, утвержденная Россельхознадзором 20 июня 2014 года.

Номер регистрационного удостоверения: 43-3-30.12-3858N/76P-3-15/01633