

Инструкция

по применению Цитодерм шампуня лечебного с хлоргексидином
(Организация-производитель: ЗАО «НПФ «Экопром», Россия)

Номер регистрационного удостоверения:

Общие сведения

Состав и форма выпуска

Цитодерм шампунь лечебный с хлоргексидином в 1 мл в качестве действующего вещества содержит: хлоргексидина биглюконат – 42,4 мг, а в качестве вспомогательных компонентов: лаурет-7 цитрат, диэтаноламид кокосового масла, кокамидопропилбетаин, глицерил кокоат, трилон Б, экстракт прополиса, экстракт алоэ вера, гидрогенизированное касторовое масло, отдушку «Ромашка», полуформаль бензилового спирта, гидроксид калия, воду питьевую.

Цитодерм шампунь лечебный с хлоргексидином представляет собой густую, прозрачную от светло-желтого до желтого цвета жидкость.

Выпускают препарат расфасованным по 200 мл в полимерные флаконы соответствующей вместимости, укупоренные пластмассовыми крышками флип-топ и далее помещают поштучно вместе с инструкцией по применению в картонные пачки.

Лекарственная форма

Раствор для наружного применения.

Фармакологические свойства

Цитодерм шампунь лечебный с хлоргексидином относится к антисептикам местного антибактериального, противовоспалительного и ранозаживляющего действия.

Хлоргексидина биглюконат, входящий в состав препарата, обладает бактерицидным действием по отношению к вегетативным формам грамположительных и грамотрицательных аэробных и анаэробных бактерий (*Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Clostridium* spp., *Actinomyces* spp.). Механизм действия хлоргексидина основан на его способности изменять свойства клеточной мембранны микроорганизма. После диссоциации солей хлоргексидина образовавшиеся катионы вступают в реакцию с оболочками микроорганизмов, имеющими отрицательный заряд. При этом липофильные группы вещества способствуют дезагрегации липопротеиновой мембранны

клетки, вследствие чего происходит нарушение осмотического равновесия и наступает гибель микроорганизма. Хлоргексидин активен в отношении грибков-дрожжей, дерматофитов и липофильных вирусов.

Хлоргексидин не адсорбируется в системный кровоток при местном применении и не оказывает системного действия. Сохраняет активность в присутствии гноя, крови и других физиологических жидкостей, однако она несколько снижается. Остаточное бактерицидное действие сохраняется на коже до 24 часов.

Входящие в состав препарата вспомогательные компоненты – экстракты прополиса и алоэ вера, обладают противовоспалительными и ранозаживляющими свойствами, уменьшают зуд, ускоряют процессы эпителилизации и грануляции.

Цитодерм шампунь лечебный с хлоргексидином по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего и сенсибилизирующего действия, вызывает слабое раздражение слизистых оболочек.

Показания к применению

Цитодерм шампунь лечебный с хлоргексидином применяют с лечебно-профилактической целью при бактериальных, грибковых, смешанных и атопических поражениях кожи: поверхностной и глубокой пиодермии, атопического дерматита, дерматофитозов (малассезионный дерматит), блошиного дерматита, межпальцевого дерматита (пододерматита), межпальцевого кистозного фолликулита у собак и кошек как отдельно, так и в комплексе с этиотропной, симптоматической, патогенетической и заместительной терапией, а также для профилактики осложнений после гигиенической стрижки и тримминга.

Порядок применения

Цитодерм шампунь лечебный с хлоргексидином применяют наружно. Перед обработкой препаратом кожно-волосистой покров животного обильно смачивают теплой водой, а затем наносят шампунь из расчета 0,5 - 1,0 мл на 1 кг массы животного, распределяют по всей поверхности тела и слегка втирают до образования пены, избегая попадания в глаза и предотвращая слизывание препарата животным. Через 5 - 7 минут шампунь тщательно смывают теплой водой, шерсть расчесывают гребнем и высушивают.

При дерматофитозах препарат при помощи ватного диска наносят на пораженные участки тела, а затем через 5 - 7 минут тщательно смывают теплой водой и слегка подсушивают.

Обработку повторяют через 3 - 7 дней в зависимости от тяжести заболевания. Курс лечения – 3 - 4 недели.

Применение препарата не исключает использования других лекарственных средств этиотропной, симптоматической, патогенетической и заместительной терапии.

Побочные явления и осложнения

Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается.

При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата, возможны следующие реакции: избыточная саливация, слезотечение, признаки раздражения кожи. В этих случаях препарат тщательно смывают водой и при необходимости животному назначают антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

Противопоказания

Противопоказанием к применению является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе). Следует избегать попадания препарата на конъюнктиву глаза.

Передозировка

Симптомов передозировки препаратом не установлено.

Применение при беременности и в период лактации

Осуществляется только под наблюдением ветеринарного врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Применение препарата не исключает использования других лекарственных средств этиотропной, симптоматической, патогенетической и заместительной терапии.

Особые указания

Применение препарата у молодняка домашних животных осуществляется только под наблюдением ветеринарного врача.

Меры личной профилактики

При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. По окончанию работы с препаратом руки следует вымыть теплой водой с мылом. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

Условия хранения

Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 0 °C до 25 °C и относительной влажности воздуха не более 60%. Срок годности препарата при соблюдении условий хранения – 2 года со дня производства. По истечении срока годности препарат не должен применяться. Применять препарат только по назначению. Не использовать для бытовых целей пустые флаконы.

Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Организация-производитель: ЗАО «НПФ «Экопром», Российская Федерация, 140070, Московская обл., Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, 11.

Разработчик: Neoterica GmbH / Неотерика ГмбХ, Grillostr. 18, 45141, Essen, Germany / Грилло стр. 18, 45141, Эссен, Германия.

Глава 13. «Гарантии организации-производителя»

13.1 Организация-производитель гарантирует соответствие качества поставляемого препарата требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий хранения и транспортировки, установленных настоящим стандартом.

13.2 Срок годности препарата – 2 года со дня производства. Днем производства считается день выполнения первой производственной операции, связанной со смешиванием фармацевтической субстанции с другими компонентами.